

Préparation du contrôle de synthèse n°1

Objectifs et exercices variés

Classes de 5^e - Mathématique 6h - A. Vandenbruaene

Trigonométrie

Objectifs

- Démontrer les grandes formules de la trigonométrie (addition, sauf $\cos(a-b)$, duplication et Simpson).
- Calculer une amplitude d'angle, une longueur d'arc de cercle et une aire d'un secteur circulaire.
- Appairer des graphiques de transformées de fonctions trigonométriques et des expressions analytiques.
- Trouver l'expression analytique d'une transformée d'une fonction trigonométrique à partir de son graphique.
- Tracer le graphique d'une transformée d'une fonction trigonométrique (après avoir déterminé ses principales caractéristiques : période, amplitude, extrema, etc.)
- Résoudre une équation ou une inéquation trigonométrique (revoir les différents types vus au cours).
- Utiliser les formules pour transformer, simplifier une expression, ou pour vérifier une identité.
- Résoudre un problème dans lequel intervient une fonction trigonométrique.

Exercices


1. Soit \mathcal{C} un cercle de centre O et de 4(cm) de rayon. Soient A , B , P et Q quatre points de \mathcal{C} .
 - a) Si l'amplitude de l'angle $A\hat{O}B$ est de 1,5 radians, calculez :
 - i. la longueur de l'arc AB ;
 - ii. l'aire du secteur circulaire AOB .
 - b) Si l'arc de cercle PQ mesure 2(cm) , calculez l'amplitude de l'angle $P\hat{O}Q$ (en radians et en degrés).

2. Soit \mathcal{C} un cercle de centre O et de 10(cm) de rayon. Sachant que R et S sont deux points de \mathcal{C} , et que l'aire du secteur circulaire ROS vaut $200 \text{ (cm}^2\text{)}$, calculez :
 - a) l'amplitude de l'angle $R\hat{O}S$;
 - b) la longueur de l'arc RS .


3. Soit la fonction $f(x) = 3 \cdot \sin(4x + \frac{\pi}{6}) + 2$.
 - a) Représentez un cycle de f après avoir déterminé ses valeurs moyenne, maximale et minimale, son amplitude et sa période.
Précisez dans quelle fenêtre vous allez représenter ce cycle.
 - b) Pour le cycle représenté, calculez l'abscisse du maximum et celle du minimum.

4. Appariez chacun des graphiques suivants à une des expressions analytiques proposées ci-dessous. Justifiez votre choix.


①




②




③




④




⑤




⑥



⑦



⑧



Expressions analytiques proposées

A. $f(x) = 2 - \cos \frac{2x}{5}$

E. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$

I. $f(x) = 1 + \sin \frac{x}{2}$

B. $f(x) = -2 \cdot \sin x - 1$

F. $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

J. $f(x) = 1 - \sin \frac{x}{2}$

C. $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 1$

G. $f(x) = 2 \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$

D. $f(x) = \sin\left(x - \frac{2\pi}{3}\right) - 1$


H. $f(x) = \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - 1$

5. Voici le graphique d'une fonction de type

$$f(x) = a \cdot \sin[b \cdot (x + c)] + d$$

Déterminez son expression analytique sachant que la fonction effectue un cycle complet entre les points

$$A\left(\frac{\pi}{12}, 1\right) \text{ et } B\left(\frac{3\pi}{4}, 1\right).$$



6. Sachant que $\cos a = -\frac{1}{4}$ et que $a \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, calculez $\sin(2a)$ et $\tan(2a)$.


7. Sachant que $\cos a = -\frac{4}{5}$ et $\cos b = \frac{1}{4}$, avec $a \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ et $b \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$, calculez :

- a) $\cos 2a$ b) $\cos(a+b)$ c) $\sin(a-b)$ d) $\tan(a-b)$

8. a) Déterminez les racines de la fonction

$$f(x) = \sin 5x - \sin 7x$$

- b) Voici la fonction f représentée dans l'intervalle $[0, 2\pi]$.
Donnez les abscisses des quinze points d'intersection de G_f et de l'axe des abscisses dans $[0, 2\pi]$.



9. Résolvez les équations trigonométriques suivantes et représentez les solutions sur le cercle trigonométrique.

- a) $2 \cdot \cos^2 x + \cos x = 0$
 b) $4 \cdot \sin^2 x + 3 \cdot \sin x - 1 = 0$
 c) $\sqrt{3} \cdot \tan x + 1 = 0$
 d) $\cos x - \sqrt{3} \cdot \sin x = \sqrt{3}$ (équation du type $a \cdot \cos x + b \cdot \sin x = c$)

10. Résolvez l'équation $\tan(3x) + \tan x = 0$ et représentez les solutions sur le cercle trigonométrique. (UCL)

11. Résolvez l'inéquation $2\sin x + 1 \geq 0$.

12. Démontrez que $\frac{\sin a}{1 + \cos a} = \tan\left(\frac{a}{2}\right)$.

13. Démontrez que $\frac{\sin 6x - \sin 2x}{2 \cdot \cos 4x \cdot (2\cos^2 x - 1)} = \tan 2x$.

14. Résolvez l'équation $\sin(3x) + \sin(4x) - 2\cos\left(\frac{x}{2}\right)\sin\left(\frac{x}{2}\right) = 0$. (UMons)

Vecteurs de l'espace et produit scalaire

Objectifs

- Associer un point de l'espace à ses coordonnées dans un repère.
- Calculer les composantes et la longueur (norme) de vecteurs de l'espace.
- Savoir construire une combinaison linéaire de vecteurs de l'espace (dans un cube par exemple).
- Savoir calculer un produit scalaire de trois façons.
- Vérifier l'orthogonalité de deux vecteurs.
- Calculer l'angle entre deux vecteurs (avec application au calcul d'un angle dans un polyèdre).
- Démontrer une propriété géométrique à l'aide du calcul vectoriel ou du produit scalaire (alignement, parallélisme, orthogonalité).
- Démontrer le théorème d'Al-Kashi à l'aide du produit scalaire.

Exercices


Nous travaillons toujours dans un repère orthonormé du plan ou de l'espace

1. Soient les points $A(2,7,9)$, $B(5,7,8)$ et $C(3,5,0)$.
 - a) Calculez la longueur du vecteur $5 \cdot \overrightarrow{AB} - 3 \cdot \overrightarrow{AC}$.
 - b) Déterminez les coordonnées d'un point D d'abscisse 24 pour que les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{CD} soit parallèles.
 - c) Calculez l'angle aigu entre les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .
2. On donne les points $A(0,2)$, $B(15,8)$ et $C(-3,24)$.
 - a) Montrez que le point $H(5,4)$ appartient à la droite AB .
 - b) Montrez que CH est une hauteur du triangle ABC .
 - c) Calculer l'aire du triangle ABC .

3. On donne les points $A(3,0)$ et $B(7,3)$. Soit la droite $d \equiv 4x + 3y - 18 = 0$.
- Représentez A , B et d .
 - Montrez que pour tout point P de la droite d , le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP}$ est constant. Pourquoi ? Quelle est sa valeur ?


4. Calculez les valeurs du paramètre m pour que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} m \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} m-1 \\ 0 \\ m \end{pmatrix}$ soient orthogonaux.

5. Dans le cube $ABCDEFGH$, construisez :
- le point R tel que $\overrightarrow{ER} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC}$;
 - le point S tel que $\overrightarrow{BS} = \overrightarrow{CD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DH}$.




6. Soient un parallélépipède $ABCDEFGH$, et les points $P \in [BF]$, $Q \in [BC]$, $R \in [DH]$ et $S \in [EH]$.

Sachant que $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{RH}$ et que $\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{SH}$, démontrez que $PQRS$ est un parallélogramme.



7. Voici une pyramide $SABCD$. Le centre de sa base carrée est le point O , origine des axes. Les points B et S ont pour coordonnées respectives $(1,1,0)$ et $(0,0,2)$.

- Déterminez l'amplitude de l'angle \widehat{ASB} , en calculant l'angle entre les vecteurs \overrightarrow{SA} et \overrightarrow{SB} .
- Que vaut le produit scalaire $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BS}$?



8. On donne le vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 10 \\ -\sqrt{5} \\ 4 \end{pmatrix}$.

On considère un autre vecteur \vec{v} , formant avec \vec{u} un angle de 60° , et tel que le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ égale 33. Déterminez la longueur du vecteur \vec{v} .


Géométrie synthétique de l'espace

Objectifs

- Connaître les critères de parallélisme d'une droite et d'un plan, de deux plans.
- Connaître les critères d'orthogonalité d'une droite et d'un plan, de deux plans.
- Dans un polyèdre, démontrer le parallélisme ou l'orthogonalité de droites, de plans, ...
- Démontrer une propriété géométrique par une méthode synthétique.
- Démontrer le « théorème du toit ».


Exercices

1. Dans le cube $ABCDEFGH$, démontrez que :
 - a) la droite DG est parallèle au plan ACF ;
 - b) le plan DEG est parallèle au plan ACF ;
 - c) la droite BH est perpendiculaire au plan ACF ;
 - d) les plans BDH et ACF sont perpendiculaires.



2. Une pyramide $SABCD$ a pour base un quadrilatère plan $ABCD$. Si les points M , N , P et Q sont les milieux respectifs des segments $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$ et $[SD]$, démontrez que le plan $MNPQ$ est parallèle au plan $ABCD$.

3. Dans un octaèdre régulier $ABCDEF$, démontrez que :
 - a) la droite AC est perpendiculaire au plan $DEBF$;
 - b) le plan $AECF$ est perpendiculaire au plan $DEBF$.



4. Voici un tétraèdre régulier $ABCD$. Ses quatre faces sont des triangles équilatéraux. Soit G le centre de gravité de la face ABC .

Démontrez que la droite DG est perpendiculaire au plan ABC .

